



RM cerebral com Angio RM Pesquisa de lesões vasculares arteriais	REQUER JEJUM DE 4H
Eco-doppler das carótidas	Este exame não carece de qualquer preparação prévia.
Angio TC das Coronárias	<p>O Paciente deverá enviar por email ou apresentar-se neste Serviço, trazendo um ECG e análises recentes com função renal (creatinina), pelo menos 2 dias antes do exame. Juntamente deverá trazer toda a medicação habitual, nomeadamente para o coração e hipertensão. Se não contra-indicado, ser-lhe-á dado um comprimido de β-bloqueante para ser tomado à noite na véspera do exame, depois do jantar.</p> <p>No dia do exame deverá fazer a medição habitual, caso o profissional de saúde que falou consigo na véspera não lhe tenha recomendado parar algum medicamento. Deverá vir acompanhado e com disponibilidade de tempo. REQUER JEJUM DE 4H</p>
TCdoTórax com contraste Pesquisa denódulos pulmonares e avaliação do mediastino	REQUER JEJUM DE 4H
RM Mamária	REQUER JEJUM DE 4H
TC abdominal	REQUER JEJUM DE 4H
Colonoscopia virtual por TC	<p>Por favor telefone previamente para a clínica de forma a pedir que lhe enviem para o seu endereço o preparado específico deste exame. Alternativamente poderá dirigir-se à clínica para o levantar. Este preparado que iremos fornecer gratuitamente é necessário para a realização do exame.</p> <p>Compre na farmácia uma embalagem de Citrafleet com a devida antecedência (não precisa de receita médica).</p> <p><u>É estritamente necessário que o examinado respeite as seguintes regras:</u> NA VÉSPERA DO EXAME</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Às 8 h da manhã, beba o preparado líquido que lhe fornecemos (agite bem a garrafa antes de beber). 2. Misture um frasco de Citrafleet num copo de água e beba; de seguida comece a beber água, até prefazer 1 litro. 3. Durante este dia, deverá fazer uma dieta sem quaisquer resíduos (dieta líquida: iogurtes sem pedaços, sopa passada, chá, etc.) 4. Às 20h, beba o segundo frasco de Citrafleet, misturado num copo de água; de seguida beba mais 1 litro de água. <p>Compareça a hora marcada tendo atenção ao jejum de 4H</p>
TC da coluna dorsal e lombar	REQUER JEJUM DE 4H
RM pélvica	REQUER JEJUM DE 4H